



VELKÉ PAVLOVICE



NĚMČIČKY



KOBYLÍ



VRBICE



BOŘETICE

VINIČNÍ TRATĚ VOC MODRÉ HORY LEGENDA

- VINIČNÍ TRATĚ
- HRANICE VINIČNÍ TRATĚ
- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- VINAŘSTVÍ

Členové VOC Modré Hory

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 Rodinné vinařství Jedlička & Novák | 11 Vinařství Baloun |
| 2 Vinařství Pazderka | 12 Lubomír Zborovský |
| 3 Vinné sklepy Roztoky, s.r.o. | 13 Marek Suský |
| 4 PATRIA Kobylí, a.s. | 14 SYFANY s.r.o. |
| 5 Ing. Jan Stávek, PhD. | 15 Vít Sedláček |
| 6 Zemědělské družstvo Němčičky | 16 Leoš Horák |
| 7 Radim Stávek | 17 Vinařství Halm, s.r.o. |
| 8 Ing. Pavel Lacina | 18 Bednaříková Helena |
| 9 „MITOMA“ Vrbič, s.r.o. | 19 Vinařství Bukovský |
| 10 Vinařství V & M Zborovský, v.o.s. | 20 Stanislav Novák |

Viniční tratě VOC MODRÉ HORY

Je to snadné, je to prosté, poznávat kde naše réva roste. Modré hory, červených vín krajina, na Vrbici končí, v Pavlovicích začíná.

Pětihvězdí moravských vinařských obcí je odedávna známé svými červenými víny ze svahových viničních poloh rozložených okruhem ve zvlněné krajině přímo ve středu Velkopavlovické podoblasti. K rovinatému jihu otevřená „Rukapáně“ je jako úrodná a mozolnatá dlaň, z níž vychází pět cílých a tvořivých prstů, které modelovaly svahy v okolí lidských sídlíšť do tvaru polí, sadů, vinic i lesů. Těmi pomyslnými prsty prochází náhodný poutník a slabikuje jejich jména jak by četl radost z doteků dětské ruky: Velké Pavlovice, Němčíčky, Bořetice, Kobylí a nejvýš položená Vrbice.

Když se rozloží večerní soumrak pozdního léta nad krajinou a zastihne poutníka na některém z řady vyvýšených míst, vystupují ze zvlněné krajiny namodralé siluety návrší porostlých vinicemi a v údolích mizí v modravém šeru červené střechy dědin. „Modré hory“ se ukládají pokorně k nočnímu spánku, aby jejich vinice, osvětžené nočním chladem a ranní rosou vstávaly do nového, sluncem prozářeného dne. Ve zlatém slunečním jasu probleskuje modrá barva mezi tmavou zelení listů révy modrými hrozny starosvětské Frankovky, Modrého Portugalu i Svatovavříneckého.

Více než polovinu rozlohy vinic tu zaujímají modré odrůdy a staří věřili, že jejich tvrdá a tříslovitá červená vína jsou krví krajiny a životadárnou silou, která se rodí v místních „starých horách“ kropených potem i v temném podzemí sklepních uliček. Dávne časy svazovaly místní vinaře přísnými pravidly horenských řádů. Vinohrad byl vinaři hradem. Ten kousek půdy osázený keři révy byl kusem jeho osobnosti, byl sounděžitostí jeho svébytnosti. To niterné spojení člověka s jeho půdou, s jeho keři, s jeho vínem bylo od nejstarších dob pevným poutem k rodné hroudě. Je na nás, abychom se snažili takové vztahy chápat a nalézat jejich odraz ve vinech našich moravských viničních hor.

Prof. Ing. Vítěm Kraus CSc., nestor moravského a českého vinařství

Přírodní podmínky:

Svažitě viniční tratě regionu MODRÉ HORY poukazují na první výběžky Žďánické-ho lesa. Viniční hory tohoto regionu mají zvláštní charakter. Většinu z nich severní strana spojuje právě stromovým porostem se Žďánickým lesem, jižní části kopců se pak obrací směrem k Pálavským vrchům a úrodným rovinám podpálaví. V regionu se nachází množství přírodních památek a rezervací, ze kterých je nutné jmenovat například lokalitu Jesličky nebo Nosperk v Němčičkách, či Zázmoniky v Bořeticích. Tato ekologicky významná místa jsou povětšinou historickými viničními tratěmi a do dnešních dní s produkčními vinicemi sousedí. Nachází se zde bohatá fauna i flóra, často stepní společenstva vzácných druhů rostlin. Vyskytuje se zde, jako na jediném místě na Moravě Včelník rakouský, dále potom Hlaváček jarní, Kavylí sličný, Vstavač vojenský, Kosatec pestrý. Na území Modrý hor se také nachází několik stromů Oskeruše domácí nebo-li Jeřábu oskeruše (Sorbus domestica), který je považován za strom Slovácka. V Němčičkách v lokalitě Nové Hory a Soudná jsou k vidění dokonce dva státem chráněné stromy, které mají stáří až 350 let. Z fauny potom nutno jmenovat především vzácnou Kudlanku nábožnou, Roháče obecného nebo Babočku paví oko.

Ampelografické podmínky:

Výnos na zdejších vinicích se od roku 1926 pohybuje průměrně kolem 6 tun na hektar. Následující tabulky ukazují zastoupení odrůd VOC v jednotlivých viničních tratích:

Půdně-geologické podmínky:

Geologicky leží oblast na východní hranici Podšleszsko-žďánického příkrovu a Vídeňské pánce. Mezi Kobylím - Vrbicí a Bořeticemi - Němčičkami probíhá právě jejich zlom. Střídají se zde vápenité jíly, slíny, polymiktní pískovice a slepence. Znatelná je karpat-ská soustava flyšového pásma. Občas se vyskytuje spraš (např. vrbecká Nová hora). Pro tyto vápenité sedimenty jsou typické dostatečné obsahy všech prvků. Hloubka půdního profilu se pohybuje od 30 do 50 cm. Průměrný obsah půdního skeletu je kolem 6 až 15 %, zřídka až 25 % (např. kobylský Holý kopec). V některých tratích jako např. v němčičských Novosádech nad Preslůzy půdní skelet úplně chybí.

Klimatologické podmínky:

Zránní hroznů v jižní části urychlují také fénické větry. Dlouhodobý průměr ročních teplot zde je 9,5 °C. Douhodobý roční sluneční svit je 1871 hodin. Jedná se tedy o jedno z nejslunnějších a nejteplejších míst v republice. Ročně zde spadne cca 580 mm srážek.

Vína VOC MODRÉ HORY:

Vinaři z VOC MODRÉ HORY v tomto specifickém mikroregionu zvolili pro výrobu reprezentačních VOC vín pouze tři odrůdy. Frankovku, Svatovavřínecké a Modrý Portugal. Tyto tři modré odrůdy jsou historicky rozšířené a dnes zde nejpěstovanější, protože zde nachází optimální půdněklimatické podmínky. Z těch odrůd mohou být vyráběna pouze mladá rosé vína a červená vína po 18 měsíčním zrání v sudu nebo v lahvi. Minimální cukernatost hroznů pro výrobu vín VOC MODRÉ HORY JE 19 °, přičemž hektarový výnos je omezen na 7 t.

Kulturní podmínky:

Národopisně patří tato oblast do regionu Hanácké Slovácko, což sebou nese i jisté zvyky, které se ve zdejších obcích traďují. Nejvýznamnější slavností téměř každé obce jsou tradiční hody, které se v místě konají povětšinou v termínu vysvěcení zdejšího kostela. Slovácké písně se v těchto dnech linou nejen „z pod máje“, ale také z četných sklepů. Netřeba zmiňovat, že většina z nich opěvuje právě révu vinnou a víno. Typickým tancem tohoto regionu je Hanáckoslovácká skočná nebo originální sváteční obřadní tanec Zavádka. Z opravdu historických tradic je nutno zmínit tzv. „Zarážení hory“, které se odehrává dnes už spíše jako připomenutí dávných časů v každé z mod-rohorských obcí. Hanácké Slovácko, ani vyhraněný region Modré hory, není jazykově jednotným celkem. Vyskytují se zde dvě skupiny nářečí, středomoravská (hanácká) a východomoravská (moravskoslezská).

Sklepy – architektura a vybavení:

Rozmístění sklepů může být nepravidelně v obci (Němčíčky, Velké Pavlovice) nebo ve sklepních uličkách. Tyto jsou k vidění v Bořeticích – Kraví hora, v Kobylí – Suchořádská zmla a na Vrbici – pětipatrový sklepní komplex na Stráži. Typické tradiční sklepy zdejšího regionu jsou s patrovými lisovnami, které jsou štítově nebo okapově orientované. V přízemí se nachází lisovna, přes kterou se prochází do kvelbeného sklepa. Malebnost zdejšího vinařství dokreslují menší sklípky. Moderní vinařství disponují nadzemními moderními halami, ve kterých se nachází kompletní provoz.

→ Charakteristika viničních tratí obcí	
VELKÉ PAVLOVICE	
1) Bojanovska Expozice: V Svažitost: 10% Nadmořská výška min v m: 210 Nadmořská výška max:290 Nadmořská výška průměrná : 250 Druh půdy: písčitohlinitá pH: 7,3 Systém vedení: 100% střední	
2) Lizníperky Expozice: JV, J, JZ Svažitost: 10-35% Nadmořská výška min v m: 190 Nadmořská výška max:292 Nadmořská výška průměrná : 230 Druh půdy: písčitohlinitá pH: 7,7 Systém vedení: 95% střední	
3) Nadzahrady Expozice: V,J,JZ, JZ, SZ Svažitost: 10-20% Nadmořská výška min v m: 174 Nadmořská výška max:225 Nadmořská výška průměrná : 200 Druh půdy: hlinitopísčítá pH: 7,6 Systém vedení: 90% střední, 10% vysoké	
4) Nové hory Expozice: JV,V, SZ Svažitost: 10 -15% Nadmořská výška min v m: 200 Nadmořská výška max:310 Nadmořská výška průměrná : 218 Druh půdy: hlinitá pH: 7,4 Systém vedení: 97% střední	
5) Staré hory Expozice: SV, S, J, JZ, JV Svažitost: 10 – 40 % Nadmořská výška min v m: 190 Nadmořská výška max:260 Nadmořská výška průměrná : 232 Druh půdy: jílovitohlinitá pH: 7,3 Systém vedení: 100% střední	
6) Trkmanska Expozice: JZ Svažitost: 7% Nadmořská výška min v m: 180 Nadmořská výška max:250 Nadmořská výška průměrná : 210 Druh půdy: hlinitá pH: 7,2 Systém vedení: 82% střední	
7) Išperky Expozice: JV-JZ, SV, V Svažitost: 15- 25% Nadmořská výška min v m: 180 Nadmořská výška max:290 Nadmořská výška průměrná : 233 Druh půdy: hlinitá pH: 7,7 Systém vedení: 60% střední, 40% vysoké	
NĚMČIČKY	
8) Dlouhé Kněžské Expozice: S,JZ Svažitost: 0-7% Nadmořská výška min v m: 276 Nadmořská výška max:315 Nadmořská výška průměrná : 296 Druh půdy: SVV-jílovitá, ZW-hnědozem-písek pH: 7,7 Systém vedení: 100% vysoké	
9) Hrušový Expozice v, JZ Svažitost: 0-15% Nadmořská výška min v m: 250 Nadmořská výška max: 300 Nadmořská výška průměrná: 268 Druh půdy: hlinito-písčítá,jílovito-hlinitá pH: 7,6 - 7,7 Systém vedení: 90% střední 10% vysoké	

VELKÉ PAVLOVICE	
10) Kolberk Expozice J-JZ,JV Svažitost: 12-18% Nadmořská výška min v m: 255 Nadmořská výška max:310 Nadmořská výška průměrná : 280 Druh půdy: hlinitopísčítá, část hlinito-jílovitá pH: 7,6-7,8 Systém vedení: 50% střední 45% vysoké, 5% nízké	
11) Zbavce Expozice: JZ, S, SV Svažitost: 0-8% Nadmořská výška min v m: 190 Nadmořská výška max:290 Nadmořská výška průměrná: 261 Druh půdy: písčito-hlinitá pH: 7,7 - 7,8 Systém vedení: 23% střední 77% vysoké	
12) Rúžený Expozice: J,JZ,SV Svažitost: 3-18% Nadmořská výška min v m: 200 Nadmořská výška max:300 Nadmořská výška průměrná: 242 Druh půdy: písčítá pH: 7,8 Systém vedení: 24% střední 76% vysoké	
13) Odměry Expozice: J Svažitost: 0-3 % terasy, 8% Nadmořská výška min v m: 260 Nadmořská výška max:310 Nadmořská výška průměrná: 296 Druh půdy: hnědozem + písek, barva půdy hnědožlutá pH: 7,7 Systém vedení: 100% vysoké,	
14) Staré hory Expozice: J,J,V,JZ Svažitost: 8-15 % Nadmořská výška min v m: 245 Nadmořská výška max:295 Nadmořská výška průměrná: 270 Druh půdy: hnědozem s příměsí písku pH: 7,7 Systém vedení: 80% vysoké, 20% střední	
15) Novosády Expozice: JV Svažitost: 18-20 Nadmořská výška min v m: 220 Nadmořská výška max:240 Nadmořská výška průměrná: 230 Druh půdy: hlinitá pH: 7,8 Systém vedení: 97% střední 1% vysoké, 2% nízké	
16) Filiberky Expozice: V,JZ,SZ,S,SV,JV Svažitost: 0-20 % Nadmořská výška min v m: 240 Nadmořská výška max: 305 Nadmořská výška průměrná: 281 Druh půdy: Jílovito-hlinitá, jílovitá černo-zem,barva černá pH: 7,6-7,8 Systém vedení: 82% střední, 17% vysoké, 1% nízké	
17) Bočky Expozice: J,JV Svažitost: 12-15 % Nadmořská výška min v m: 260 Nadmořská výška max:280 Nadmořská výška průměrná: 270 Druh půdy: hlinito-hlinitá pH: 7,6 Systém vedení 97% Střední 3% Vysoké	
18) Soudná Expozice: J,JZ Svažitost: 0,05 Nadmořská výška min v m: 220 Nadmořská výška max:290 Nadmořská výška průměrná: 255 Druh půdy: hlinito-písčítá pH: 7,7 Systém vedení 100% Střední	
19) Veselý Expozice: J Svažitost: 18-20% Nadmořská výška min v m: 210 Nadmořská výška max:280 Nadmořská výška průměrná: 245 Druh půdy: písčítá pH: 7,8 Systém vedení: 75% Střední 24% Vysoké 1% nízké	
BOŘETICE	
20) Kraví hora Expozice: J Svažitost: 15-30% Nadmořská výška min v m: 180 Nadmořská výška max: 270 Nadmořská výška průměrná: 230 Druh půdy: písčito-hlinitá pH: 7,3 Systém vedení: 99% střední	
21) Tálky za kostelem Expozice: JZ Svažitost: 10-15% Nadmořská výška min v m: 176 Nadmořská výška max: 201 Nadmořská výška průměrná: 189 Druh půdy: hlinito-písčítá pH: 7,3 Systém vedení: 100% střední	
22) Čtvrtě Expozice: JZ-SZ Svažitost: 10-35% Nadmořská výška min v m: 190 Nadmořská výška max:274 Nadmořská výška průměrná : 235 Druh půdy: hlinitá pH: 7,3 Struktura půdy: skelet do 10% Systém vedení: 99% střední	
23) Tkmanska Expozice: JZ-SZ Svažitost: 8-15 % Nadmořská výška min v m: 245 Nadmořská výška max:295 Nadmořská výška průměrná: 236 Druh půdy: hnědozem s příměsí písku pH: 7,5 Systém vedení: 97% střední 3% vysoké	
24) Terasy Expozice: JZ Svažitost: 10-45 Nadmořská výška: min v m: 176 Nadmořská výška max:324 Nadmořská výška průměrná : 250 Druh půdy: hlinito-písčítá pH: 7,5 Systém vedení: 95% střední, 5% nízké	
KOBYLÍ	
25) Lumperky Expozice: JV, J Svažitost: 15-25 Nadmořská výška min v m: 200 Nadmořská výška max:260 Nadmořská výška průměrná : 235 Druh půdy: písčito-hlinitá pH: 7,6 Systém vedení: střední 100%	
26) Zámlynská Expozice: V, JV Svažitost:10 - 25% Nadmořská výška min v m: 180 Nadmořská výška max:250 Nadmořská výška průměrná : 220 Druh půdy: písčito-hlinitá pH: 7,6 Systém vedení: 100% střední	
27) Láčary Expozice: J, JV, J Svažitost: 25% - 30% Nadmořská výška min v m: 200 Nadmořská výška max: 250 Nadmořská výška průměrná : 220 Druh půdy: písčítá pH: 7,7 Systém vedení: 100% střední	

28) Sovinky Expozice: JZ Svažitost: 12% Nadmořská výška min v m: 240 Nadmořská výška max:280 Nadmořská výška průměrná : 260 Druh půdy: písčito-hlinitá pH: 7,6 Systém vedení: 100% střední	
29) Dvořanky Expozice: Z Svažitost: 15 – 20% Nadmořská výška min v m: 190 Nadmořská výška max:266 Nadmořská výška průměrná : 228 Druh půdy: hlinitá pH: 7,4 Systém vedení: střední 100%	
30) Holý kopec Expozice: J, Z, SZ Svažitost: 10 - 25% Nadmořská výška min v m: 200 Nadmořská výška max:260 Nadmořská výška průměrná : 230 Druh půdy: hlinitá, Hlinito-písčítá pH: 7,4 Systém vedení: 97%	
31) U skalky Expozice: Z Svažitost: 30% Nadmořská výška min v m: 210 Nadmořská výška max:320 Nadmořská výška průměrná : 260 Druh půdy: písčito-hlinitá pH: 7,5 Systém vedení: 100% střední	
32) Nivky Expozice: JZ Svažitost: 10 - 12% Nadmořská výška min v m: 260 Nadmořská výška max:330 Nadmořská výška průměrná : 285 Druh půdy: písčito-hlinitá pH: 7,6 Systém vedení: 99% střední	
33) Padělky Expozice: Z Svažitost: 10-14% Nadmořská výška min v m: 180 Nadmořská výška max:288 Nadmořská výška průměrná : 265 Druh půdy: písčito-hlinitá, hlinitá pH: 7,4 Systém vedení: 100%střední	
34) Rokyti Expozice: SZ Svažitost: 12% Nadmořská výška min v m: 200 Nadmořská výška max:270 Nadmořská výška průměrná : 225 Druh půdy: hlinitá pH: 7,6 Systém vedení: 99% střední	
35) K lůkám Expozice: SZ, Z, J Svažitost: 10% Nadmořská výška min v m: 220 Nadmořská výška max:290 Nadmořská výška průměrná : 255 Druh půdy: písčito-hlinitá pH: 7,6 Systém vedení: není osázena	
36 a 37) Žleby Expozice: JV Svažitost: 10% Nadmořská výška min v m: 210 Nadmořská výška max:268 Nadmořská výška průměrná : 237 Druh půdy: písčito-hlinitá pH: 7,4 Systém vedení: 100% střední	
VRBICE	
38) Krátký Expozice: JV-JZ Svažitost: 3-13% Nadmořská výška min v m: 230 Nadmořská výška max:322 Nadmořská výška průměrná : 268 Druh půdy: hlinito - písčítá pH: 7,4 Struktura půdy: skelet do 10% Systém vedení: 55% střední, 44% vysoké	
39) Ochoze Expozice: JV,V Svažitost: 9-12% Nadmořská výška min v m: 228 Nadmořská výška max:276 Nadmořská výška průměrná : 250 Druh půdy: hlinitá pH: 7,4 Systém vedení: 95% střední	
40) Skale Expozice: J,SV,V Svažitost: 8-13% Nadmořská výška min v m: 220 Nadmořská výška max:282 Nadmořská výška průměrná : 245 Druh půdy: hlinitá, Písčito-hlinitá pH: 7,2 Systém vedení: 53% střední, 47% vysoké	
41) Stráně Expozice: JV Svažitost: 8-10% Nadmořská výška min v m: 226 Nadmořská výška max:262 Nadmořská výška průměrná : 244 Druh půdy: hlinitá pH: 7,4 Systém vedení: 92% střední, 8% nízké	
42) Úlehle Expozice: JZ,J Svažitost:8- 9% Nadmořská výška min v m: 200 Nadmořská výška max:260 Nadmořská výška průměrná : 224 Druh půdy: hlinitá pH: 7,2 Systém vedení: 81% střední, 19% vysoké	
43) Záhumenice Expozice: JV Svažitost: 8-13% Nadmořská výška min v m: 242 Nadmořská výška max:320 Nadmořská výška průměrná: 296 Druh půdy: hlinitá pH: 7,3 Systém vedení: 100% střední	
44) Nová hora Expozice: J,JV Svažitost: 2-15% Nadmořská výška min v m: 200 Nadmořská výška max:240 Nadmořská výška průměrná : 220 Druh půdy: hlinitá pH: 7 Systém vedení: 100% střední	



Realizováno za podpory Vínářského fondu